



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 75-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे फूलगोभी और पत्तागोभी की रोपाई शुरू कर दें और साथ ही गोभी और फूलगोभी की देर से बोई गई किस्मों की बुआई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म- बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	31.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	290	290	290	70	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	3

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80-85 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे फूलगोभी और पत्तागोभी की रोपाई शुरू कर दें और साथ ही गोभी और फूलगोभी की देर से बोई गई किस्मों की बुआई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म- बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाईकरें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 75-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे फूलगोभी और पत्तागोभी की रोपाई शुरू कर दें और साथ ही गोभी और फूलगोभी की देर से बोई गई किस्मों की बुआई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म- बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाईकरें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	32.0	32.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 75-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे फूलगोभी और पत्तागोभी की रोपाई शुरू कर दें और साथ ही गोभी और फूलगोभी की देर से बोई गई किस्मों की बुआई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	30.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 35-40 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 70-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे फूलगोभी और पत्तागोभी की रोपाई शुरू कर दें और साथ ही गोभी और फूलगोभी की देर से बोई गई किस्मों की बुआई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 75-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे फूलगोभी और पत्तागोभी की रोपाई शुरू कर दें और साथ ही गोभी और फूलगोभी की देर से बोई गई किस्मों की बुआई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 35-40 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 70-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 19-21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	19.0	19.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	290	290	290	70	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	3

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80-85 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 35-40 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 70-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 19-21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 35-49 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 70-75 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 19-21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौधे - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	250	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

• आगामी पांच दिनों के दौरान आसमान साफ रहेंगे । • आगामी पांच दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है । • न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-45 % और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 75-80 % होने की संभावना है। • न्यूनतम तापमान लगभग 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। • 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है की आलू (किस्म-कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण), बरसीम (किस्म-बारदान 1, स्केबी इत्यादि), सूरजमुखी, लहसुन (किस्म - जमुना सफेद 2, जमुना सफेद 3, जमुना सफेद 5, जमुना सफेद 4 आदि) की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

रबी फसलों जैसा दालें, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। किसानों को अल्पअवधि की तोरिया, शुरुआती आलू, सूरजमुखी और सब्जियों की बुवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	इस मौसम में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में - पूसा प्रगति, बीज दर 35-40 कि.ग्रा. प्रति एकड़। बीजों को कवकनाशी केप्टान @ 2.0 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगायें। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें।
सरसों	तोरी की किस्म जैसाआर. ए.यू.टी.एस. 17, पांचाली, पी.टी. 303 या भवानी की बुवाई करनी चाहिए। बीज दर 5 किलोग्राम / हेक्टेयर। बुवाईस्टिन 50% धूल @ 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुवाई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। शुरुआती लक्षणों में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ पत्ती म्यान में आंखों के आकार का स्थान शामिल है। बाद में इन स्थानों पर बड़े धब्बे बनने के लिए तना हुआ होता है। यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो बाविस्टिन 2 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल के साथ 2-3 बार प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को प्रति दिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ एक चम्मच नमक दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	सब्जियों में (टमाटर, मिर्च, बैंगन फूलगोभी व पत्तागोभी) फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्तागोभी में डायमंड बेक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4/एकड़ लगाए।