



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय  
कांके रांची, झारखंड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-01-2024

चतरा(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-01-30 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-01-31	2024-02-01	2024-02-02	2024-02-03	2024-02-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	28.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	13.0	12.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	56	78	79	51
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	29	29	32	38	27
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	9	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	105	72	112	255	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	2	2	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हवा की गति सामान्य रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

कम तापमान और नमी के तनाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सुबह के समय खड़ी सब्जियों और फसलों में हल्की सिंचाई करें। कम तापमान के दौरान मिट्टी का तापमान बनाए रखने के लिए सब्जियों की नर्सरी के ऊपर कम लागत वाले पॉलिथिन कवर या पुआल आदि का उपयोग करें। नमी की कमी वाले क्षेत्र में किसानों को सब्जियों में फूल आने की अवस्था के दौरान 2% डीएपी+1% एमओपी का पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए।

### लघु संदेश सलाहकार:

65 से 75 दिन पुरानी दिसंबर में बोई गई गेहूं की फसल अपने शाकीय अवस्था में है। किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की बेहतर उत्पादकता के लिए यदि संभव हो तो इस समय सिंचाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चेंपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारम्भिक अवस्था में प्रभावित भाग को काट कर नष्ट कर दें। अगर प्रकोप अत्यधिक दिखाई दे

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	तो इमिडाक्लोपरीड का छिड़काव 3 मिलिलीटर प्रति लीटर पाने के दर से करें।
चना	चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फीरोमोन प्रपंश @ 3-4 प्रपंश प्रति एकड़ खेतों में लगाएं जहां पौधों में 25-35% फूल खिल गये हों। "T" अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मटर	मटर की फसल में फलों की संख्या बढ़ाने के लिए 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर डंठलों पर छिड़काव करें, यह पाले से भी फसलों को बचाने में सक्षम है।
मिर्च	मिर्च की फसल में मकड़ी के प्रकोप की संभावना रहती है। कीटों के प्रकोप के कारण पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। पौधा बौना दिखाई देता है। मिर्च की फसल में घुन के प्रबंधन के लिए इथियन 50% EC @ 600-मिली/एकड़ या स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC @ 200-मिली/एकड़ का छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सर्दियों के मौसम में पशुओं को नियमित रूप से नमक के साथ खनिज मिश्रण और दैनिक राशन में 10% -20% की दर से गेहूँ के दाने, गुड़ आदि भी दें।

### मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	रात के समय कम तापमान कुक्कुट के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। इसलिए, आश्रय के वायु तापमान को बढ़ाने के लिए उचित आश्रय प्रबंधन से लाइट बल्बों की संख्या बढ़ाई जा सकती है या कमरे के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्म वायु ब्लोअर प्रदान किया जा सकता है।