



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-04-2026

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-10 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-04-11	2026-04-12	2026-04-13	2026-04-14	2026-04-15
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	19.0	21.0	22.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	34	36	29	27
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	14	11	10	8	7
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	9	11	10	7
पवन दिशा (डिग्री)	277	266	285	287	360
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में आसमान खुले रहेंगे और बारिश की संभावना नहीं है। तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है और हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NIL

सामान्य सलाहकार:

मिट्टी को खुला छोड़ने तथा गहरी जुताई करने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े-मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। भंडारण से पहले, अनाज को ठीक से साफ किया जाना चाहिए और इसे नमी की मात्रा के अनुशंसित स्तर तक सुखाया जाना चाहिए। पिछली फसल के सभी अनाज और अन्य भंडारण सामग्री को हटाकर गोदामों को ठीक से साफ करें। दीवारों की दरारों एवं दरारों की सफाई एवं मरम्मत कर सफेदी करें। बोरियों को धूप में सुखाये ताकि कीड़ों के अंडे और प्यूपा बनने की अवस्था के साथ-साथ बीमारियों के इनोकुलम भी नष्ट हो जाएं।

लघु संदेश सलाहकार:

लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा आदि में जिनका बढ़वार ज्यादा हो गया हो, उसमें झांकी लगा दें, जिससे पत्तियों एवं फलों का संपर्क सीधे मिट्टी से नहीं हो सके।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	अप्रैल के पहले हफ्ते में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और धीरे-धीरे बढ़ेगा। उच्च तापमान और उसके बाद रुक-रुक कर होने वाली गरज के साथ बौछारें ब्राउन प्लांट हॉपर के संक्रमण को बढ़ाने में सहायक होंगी। यदि बीपीएच का संक्रमण आर्थिक सीमा स्तर (5-10 हॉपर/हिल) से अधिक है, तो वैकल्पिक रूप से गीला और सुखाने की तकनीक द्वारा धान के पौधे की सूक्ष्म जलवायु को बदलने की सलाह दी जाती है (लंबे समय तक पानी खड़ा नहीं होना चाहिए)। यदि समस्या बनी रहती है, तो एज़ाडिरेक्टिन 0.15% नीम बीज फॉर्मूलेशन @ 800 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में छिड़काव करें।
मक्का	ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल में मिट्टी चढ़ाएं, जो कि घुटनों तक पहुंच गई हैं। फसल में प्रति एकड़ 26 किलोग्राम यूरिया डालें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन के फसल में तना एवं फल छेदक कीड़ों से बचाव फेरोमोन ट्रेप लगवाकर बिना रासायनिक दवाओं के किया जा सकता है। एक एकड़ में 4-5 फेरोमोन ट्रेप लगाने की अनुशंसा की जाती है। अगर फसल में फल सड़न एवं पत्ती का धब्बा रोग का आक्रमण हो रहा हो तो ग्रसित पत्तियों को तोड़ लें तथा फफूंदनाशी दवा मैनकोज़ेब का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें।
टमाटर	बारिश के बाद टमाटर के खेतों में बैक्टीरियल विल्ट (जीवाणु जनित मुरझान) की समस्या हो सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (3 ग्राम) और प्लांटोमाइसिन (1 ग्राम) को प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों में डालें।
लीची	आम एम लीची के पौधों में फल लगने के उपरांत नियमित सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए प्लानोफिक्स दवा का छिड़काव 1 मिलिलिटर प्रति 3 लीटर पानी के साथ करें।
रतालू	ओल की फसल लेने हेतु किसान भाई अच्छे जल निकासी वाली बुलाई दोमट मिट्टी का चुनाव कर उन्नत किस्में - गजेंद्र, विधान, कुसुम के लिए जाएं तथा 60 सेंटीमीटर X 60 सेंटीमीटर की दूरी तय करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण अवश्य कराएं।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
आम सीएआर पी	तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का समुचित उपाय करने के लिए मवेशी का गोबर एवं बुझा चूना का प्रयोग करें। गोबर की खाद को तालाब में किसी एक किनारे में ही डालें। मछलियों को उपरी आहार भी देना शुरू कर दें। इसके लिए चावल का कुन्दा एवं सरसों की खली को मिलाकर (दोनों 5-5 किलोग्राम प्रति दिन प्रति एकड़ की दर से) प्रयोग करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	इस मौसम में, टमाटर, मिर्च और अन्य सब्जी वाली फ़सलों में 'लीफ कर्ल' (पत्ते मुड़ने वाले) कीट का प्रकोप देखा जा सकता है, यह कीट सफ़ेद मक्खियों द्वारा फैलता है। इस बीमारी को दूसरे पौधों तक फैलने से रोकने के लिए, संक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़कर जला दें; इसके अलावा, वयस्क कीटों की निगरानी करने और उन्हें पकड़ने के लिए पौधों की ऊपरी सतह से 1 फुट ऊपर पीले चिपचिपे जाल (येलो स्टिकी ट्रैप) लगाएँ (प्रति एकड़ 05-10 जाल); या फिर पत्तियों के निचले हिस्से पर नीम का तेल (3% या 300 ppm) या साबुन का पानी (प्रति गैलन पानी में 1 चम्मच साबुन) लगाएँ, खासकर नए पौधों पर; या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL जैसे सिस्टमिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, जिसकी मात्रा 0.3 ml प्रति लीटर पानी होनी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NIL

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NIL

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>