



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय  
कांके रांची, झारखंड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-12-2025

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-12 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-13	2025-12-14	2025-12-15	2025-12-16	2025-12-17
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.2	24.7	25.2	25.9	26.4
न्यूनतम तापमान(से.)	11.5	11.9	12.5	12.5	12.2
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	69	69	68	64
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	29	31	30	28	24
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.6	6.3	6.5	7.1	7.2
पवन दिशा (डिग्री)	283	294	304	294	276
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि, हवा की गति सामान्य रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NIL

### सामान्य सलाहकार:

दिसम्बर महीने में धान की कटाई के पश्चात खाली खेतों में जो किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे गेहूं की पछेती क्रिस्मों का ही चयन करें। कम तापमान और नमी के तनाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सुबह के समय खड़ी सब्जियों और फसलों में हल्की सिंचाई करें। कम तापमान के कारण खराब अंकुरण से बचने के लिए सब्जियों की नर्सरी के ऊपर कम लागत वाले पॉलिथीन कवर का उपयोग करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

25 से 30 दिन पुरानी मटर की फसल में पहली निकाई - गुड़ाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई निम्नलिखित अवस्था पर करें। एक सिंचाई - क्राउन रुट निकलने तथा कल्ले पूर्ण होने के बिच दो सिंचाई - क्राउन रुट निकलने, बालियां निकलते समय तीन सिंचाई - क्राउन रुट निकलने, बालियां निकलते समय और दानो में दूध आते समय चार सिंचाई - क्राउन रुट निकलने, कल्ले पूर्ण होने समय, बालियां निकलते समय और दानो में दूध आते समय पांच सिंचाई - क्राउन रुट निकलने, कल्ले पूर्ण होने समय, तने में गाँठ बनने समय, बालियां निकलते समय और दानो में दूध आते समय
चना	समय पर बोई गई चना की फसल अंकुरित होने की अवस्था में है, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 25 से 30 दिन पुरानी फसल में पहली निकाई-गुड़ाई करें। यदि पर्याप्त नमी न हो तो खेत में सिंचाई कर दें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर की फसल में फली बनने की अवस्था में हो उसमे फली छेदक कीट के प्रकोप की संभावना है। इनसे बचाव हेतु किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल या स्पाइनोसैड 45 एस सी 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से करें।
सरसों	समय से बोए गए सरसों की फसल अपने वानस्पतिक अवस्था में है। अगर पौधे एक ही जगह पर ज्यादा हो तो विरलीकरण की क्रिया सुनिश्चित करें, जिससे पौधों को सही ढंग से नमी, हवा तथा तापमान प्राप्त होती रहेगी। इस अवस्था के सरसों में लाही कीट की संभावना रहती है जिसके बचाव हेतु किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	25 से 30 दिन पुरानी आलू की फसल में मिटटी चढ़ाने के कार्य को पूरा करें तथा मिटटी को भुरभुरा कर नत्रजन की शेष बची मात्रा मिलाएं (65 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़)। कहीं-कहीं आलू के फसल में अंगमारी रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इस रोग के कारण निचली पत्तियों पर छोटे, फीके-भूरे चमकदार धब्बे बनते हैं जो धीरे-धीरे ऊपर वाली पत्तियों पर फैलाने लगते हैं और अंत में पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। पौधों में ऐसा लक्षण देखते ही तुरंत फफूंदनाशी दवा रीडोमिल का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें।
गोभी	गोभीवर्गीय फसल में लाही कीट के प्रकोप की संभावना को देखते हुए किसान भाई इसके बचाव के लिए क्निनोल्फोस 25 % ई सी का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ करें।
टमाटर	जिन किसान भाइयों के टमाटर के पौधे मुरझाकर सूख रहे हैं तो वे तांबे आधारित फफूंदनाशी एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2-3 छिड़काव करें। साथ ही रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकल दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	शीत लहर की संभावना को देखते हुए, रात में मवेशियों को शेड के अंदर रखें और उन्हें सूखा बिस्तर देकर ठंड से बचाने का इंतज़ाम करें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NIL

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NIL

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**