



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-12-2025

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-09 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-10	2025-12-11	2025-12-12	2025-12-13	2025-12-14
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.5	26.0	25.7	25.8	26.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.4	12.1	11.7	12.2	12.6
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	47	45	46	55	58
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	17	18	23	23
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.4	8.4	7.9	6.8	6.6
पवन दिशा (डिग्री)	301	301	286	288	299
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि, हवा की गति सामान्य रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NIL

सामान्य सलाहकार:

खरीफ की पकी हुई फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लें। शीतकालीन सब्जी फसलों की नर्सरी बुआई या रोपाई पूरी करें। कोल फसलें, मटर, चना और मूंग की फसल की बुआई करें। उर्वरक, कीटनाशक प्रयोग और सिंचाई गतिविधियों को जारी रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

25 से 30 दिन पुरानी मटर की फसल में पहली निकाई - गुड़ाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	जो किसान इस समय गेहूँ की खेती करना चाहते हैं, वे इसके अनुशंसित पछेती किस्म (एच.आई.-1583, डी.बी.डब्लू.-107, एच.डी.-3118 आदि) का ही चयन करें। देर से बोआई करते समय सामान्य से कुछ अधिक (50 किलोग्राम प्रति एकड़) प्रयोग करें तथा बीज को फफूंदनाशी दवा बाविस्टीन (2-2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज) से उपचारित कर 18-20 सेंटीमीटर (कतार से कतार) तथा 7-9 सेंटीमीटर (पौधा से पौधा) की दूरी पर बोयें। 20-25 दिन पहले बोई गई फसल में मिट्टी में नमी को संरक्षित रखने तथा खर-पतवार नियंत्रण करने के लिए निकाई-गुड़ाई करके सिंचाई करें एवं सिंचाई के एक दिन बाद आवश्यकतानुसार यूरिया का भुरकाव (20-22 किलोग्राम प्रति एकड़) करें।
चना	समय पर बोई गई चना की फसल अंकुरित होने की अवस्था में है, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 25 से 30 दिन पुरानी फसल में पहली निकाई-गुड़ाई करें। यदि पर्याप्त नमी न हो तो खेत में सिंचाई कर दें।
अरहर (लाल चना/अरहर)	अरहर की फसल में फली बनने की अवस्था में हो उसमें फली छेदक कीट के प्रकोप की संभावना है। इनसे बचाव हेतु किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल या स्पाइनोसैड 45 एस सी 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से करें।
सरसों	समय से बोए गए सरसों की फसल अपने वानस्पतिक अवस्था में है। अगर पौधे एक ही जगह पर ज्यादा हो तो विरलीकरण की क्रिया सुनिश्चित करें, जिससे पौधों को सही ढंग से नमी, हवा तथा तापमान प्राप्त होती रहेगी। इस अवस्था के सरसों में लाही कीट की संभावना रहती है जिसके बचाव हेतु किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	25 से 30 दिन पुरानी आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने के कार्य को पूरा करें तथा मिट्टी को भुरभुरा कर नत्रजन की शेष बची मात्रा मिलाएं (65 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़)। कहीं-कहीं आलू के फसल में अंगमारी रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इस रोग के कारण निचली पत्तियों पर छोटे, फीके-भूरे चमकदार धब्बे बनते हैं जो धीरे-धीरे ऊपर वाली पत्तियों पर फैलाने लगते हैं और अंत में पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। पौधों में ऐसा लक्षण देखते ही तुरंत फफूंदनाशी दवा रीडोमिल का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें।
गोभी	रोपाई की गई गोभी में अंकुरण की अवस्था तीन सप्ताह की होती है। तीन सप्ताह की अवस्था पर निराई-गुड़ाई करें तथा प्रति एकड़ 55 किलोग्राम यूरिया डालें, तत्पश्चात सिंचाई करें। गोभी की फसल में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्पिनोसैड 45SC @ 0.5 मिली/लीटर की दर से डालें।
टमाटर	न्यूनतम तापमान में कमी और कोहरे की स्थिति के कारण टमाटर में लेट ब्लाइट की संभावना हो सकती है, लेट ब्लाइट से बचने के लिए प्रारंभिक संक्रमण अवस्था में सावधानी बरतनी चाहिए। 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल + मेन्कोजेब प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	शीत लहर की संभावना को देखते हुए, रात में मवेशियों को शेड के अंदर रखें और उन्हें सूखा बिस्तर देकर ठंड से बचाने का इंतज़ाम करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NIL

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NIL

Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>