



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-08-2025

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-08-14 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-08-15	2025-08-16	2025-08-17	2025-08-18	2025-08-19
वर्षा (मिमी)	7.0	4.0	3.0	9.0	9.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	33.0	32.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	91	93	92	93	94
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	68	65	62	64	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	8	7	8	13
पवन दिशा (डिग्री)	99	98	103	114	95
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	5	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट की संभावना है और हवा की गति सामान्य रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

फसलों का गिरना

सामान्य सलाहकार:

आगामी 5 दिनों में मौसम साफ रहने के बाद ही अंतर-कृषि कार्य, पौध संरक्षण उपाय और खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। सब्जियों के पौधों को भारी बारिश से बचाने के लिए उन्हें पालीथिन से ढक दें। मक्का, कंद फसलों, उर्द, मूंग तथा सब्जियों में जल निकासी करें। साथ ही साथ खेत में डोभा के निर्माण के माध्यम से यथास्थान संरक्षण और जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल का प्रबंधन (निचले सिरे पर भूमि क्षेत्र के 1/10वें भाग पर) करें। जो सूखे दिनों में फसलों की जल आपूर्ति को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। धान की फसल के लिए जो लोग अब तक बुआई नहीं कर पाए हैं, उन्हें कम अवधि वाली किस्मों का चयन करें, लंबी अवधि वाली धान की किस्मों का चुनाव न करें। चूंकि आर्द्रता 80% से अधिक और बारिश होने की संभावना है, इसलिए धान में रोग और कीट संक्रमण की संभावना होगी, मुख्य रूप से शीथ ब्लाइट, ब्लाइट, फुट रॉट और स्वॉर्मिंग कैटरपिलर, लीफ फोल्डर। किसानों भाई खड़ी फसलों एवं सब्जियों को खरपतवारों से बचाने के लिए निराई-गुड़ाई करें। विभिन्न सब्जियों/फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को सुदृढ़ रखें तथा रोपा धान के खेत में जल जमाव बनाए रखने के लिए खेत के मेढ़ को दुरुस्त रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

जिन किसान भाइयों ने 2 से 3 सप्ताह पहले धान की रोपाई की हो वे धान में नत्रजन की शेष 50% मात्रा में से 25% नत्रजन का भुरकाव करें। शेष 25% का भुरकाव रोपाई के 6 सप्ताह बाद करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	मक्के की फसल जहाँ भुट्टे में दाने लग रहे हैं, उनकी रखवाली का समय आ गया है। इसके लिए किसान खेतों में खम्भों के सहारे चमकीले फीता बांध दें, इस फीता पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक को देख कर पक्षी दूर भागते हैं।
चावल	जल्दी रोपाई/सीधे बोई गई फसल में, बादल छाए रहने के कारण पत्ती मोड़क कीट का संक्रमण होने की संभावना है। यदि खेत में दिखाई दे तो क्लोरेंटानिलिप्रोएल 18.5% एससी @ 3 मिली/10 लीटर पानी या फिप्रोनिल 5% एससी @ 2 मिली/लीटर पानी का छिड़काव धूप वाले दिनों में करें।
चावल	जिन किसान भाइयों ने 2 से 3 सप्ताह पहले धान की रोपाई की हो वे धान में नत्रजन की शेष 50% मात्रा में से 25% नत्रजन का भुरकाव करें। शेष 25% का भुरकाव रोपाई के 6 सप्ताह बाद करें।
चावल	आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, इसलिए किसान भाई निराई गुड़ाई / खरपतवार नियंत्रण के लिए जाएँ। 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालें, उसके बाद निराई-गुड़ाई करें और खाली जगहों को भरें। खाद डालते समय अतिरिक्त पानी निकाल दें और एक दिन बाद पानी को खेतों में डाल दें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	टमाटर की फसलों में पीला मोजेक विषाणु के प्रकोप देखे जा रहे हैं। इसमें टमाटर की पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं तथा पत्तियों में पीला रंग दिखाई देने लगता है। यह सफेद साफे मक्खी के द्वारा फैलता है। इसके लिए किसान भाई चिपचिपा जाल 3 से 5 प्रति एकड़ के दर से खेतों में लगाएँ। संक्रमित पौधों को उखाड़ कर फेक दें, जिससे ये बाकी फसलों पर ना फ़ैल पाये।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	वर्तमान मौसम में पशुओं में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं को खुला न छोड़ें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पशु दूषित पानी न पिएं, अन्यथा पशुओं को अधिक चरने से अपच हो सकती है। पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद बड़े पशुओं को नेवलोन 50 ग्राम या सल्फाडिमिडीन 1 किलो प्रतिदिन दो बार तथा छोटे पशुओं को 250 ग्राम प्रतिदिन दो बार दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	वर्तमान में, लंबे समय तक गीली स्थिति धान, मक्का और सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की संख्या बढ़ाने में मदद करती है, जिसे किनोल्फोस 25 ईसी या क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी @ 2-3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोल का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है।
पौध - संरक्षण	बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए, मिर्च और बैंगन में फल सड़न का प्रकोप होने की संभावना है। यदि दिखाई दे, तो कार्बेन्डाजिम 50% WP @ 2 ग्राम/लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP @ 3 ग्राम/लीटर पानी का छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो, तो 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा और तीसरा छिड़काव करें।
पौध - संरक्षण	आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना को देखते हुए उर्द और मूंग में फली छेदक कीट की संभावना है, इसके बचाव हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 1 मिलीलीटर प्रति 10-लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसलों का गिरना

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

सब्जी नर्सरी को सहायता प्रदान करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details