



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 03-07-2026

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-03 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-04	2026-07-05	2026-07-06	2026-07-07	2026-07-08
वर्षा (मिमी)	25.0	4.0	24.0	23.0	18.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	33.0	32.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	26.0	24.0	24.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	91	90	92	92	88
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	64	66	67	58
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	12	14	8	15
पवन दिशा (डिग्री)	98	100	86	130	207
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	7	7	6	7
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

मौसम नम एवं अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा, लगातार हल्की से मध्यम वर्षा के कारण तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। गरज-चमक, तेज हवाओं तथा बढ़ती वर्षा गतिविधियों के कारण मौसम अस्थिर रहेगा।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान, तेज़ हवाएँ आदि; सतह पर तेज़ हवाएँ

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

फसलों का गिरना, फलों का टूटना

सामान्य सलाहकार:

पिछले दिनों हुई वर्षा तथा आने वाले दिनों में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई किसी भी फसल की बुवाई से पहले जल निकासी सुनिश्चित करें तभी बुवाई के लिए जाएँ। विभिन्न खरीफ फसल की बोआई का उपयुक्त समय 30 जून तक है। धान के फसल को छोड़कर अन्य सभी फसल की बोआई मेढ़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेढ़ को दुरुस्त रखें तथा विभिन्न सब्जियों एवं फसलों के खेतों से समुचित जल निकास के लिए व्यवस्था बनाए रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें और जल निकासी की सुविधा रखें। परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई तथा गरमा मक्का की कटाई के लिए साफ़ मौसम का इंतज़ार करें। मौसम साफ़ होने तक खाद या कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे-छोटे गड्ढे (डोभा) का निर्माण करें।

लघु संदेश सलाहकार:

टमाटर, बैंगन तथा मिर्च के फसल जो 35 से 40 दिन पुराने हो उनमें निकाई - गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
रागी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रोपाई करें। रोपाई से पहले जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित श्रोत से ही खरीदें। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राईजोवियम तथा फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार करें तथा अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। इस उपचार से बीजों के अंकुरण तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। अरहर की उन्नत किस्में – एल.आर.जी.-41, बिरसा अरहर-1, नरेन्द्र अरहर-1 एवं 2, बहार, आई.सी.पी.एच.-2671 इनमें से किसी एक किस्म का चुनाव करें।
मक्का	मिट्टी में मौजूद नमी का इस्तेमाल करके बुवाई का काम पूरा करें और यह पक्का करें कि पानी की निकासी ठीक हो ताकि जड़ों के आस पास पानी जमा न हो। फॉल आर्मीवर्म के प्रकोप पर नज़र रखें; पौधों के ऊपरी हिस्सों की नियमित रूप से जाँच करें। बारिश के बाद निराई - गुड़ाई से जुड़े ज़रूरी काम और खरपतवार हटाने का काम करें। नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग तभी करें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो।
चावल	धान की नर्सरी यदि 20-25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेमी तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेमी रखें। उर्वरकों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, 16 किलोग्राम पौटाश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट / एकड़ की दर से डालें, तथा नील हरित शैवाल एक पेकेट / एकड़ का प्रयोग उन्ही खेतों में करें जहाँ पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी में येलो वेन मोज़ेक वायरस को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल @ 2 मिली / 1 लीटर पानी के साथ सुबह के समय छिड़काव करें या इस रोग को नियंत्रित करने के लिए पीले चिपचिपे जाल का उपयोग करें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पोल्ट्री कूड़े में चूना मिलाएं। 7 दिन के चूजों को आरडी का टीका दें। कोक्सीडायोसिस को रोकने के लिए पशुचिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक मुर्गियाँ न रखें। पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ायें तथा धातु के बर्तनों का प्रयोग न करें तथा ताजा ठंडा पानी दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फूल एवं फल झड़ना, फसल गिरना, जल जमाव

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें, सहारा वाली फसलों को बांधें

Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>