



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	37.0	38.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	20.0	21.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	20	20	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	5	6	7	9
पवन दिशा (डिग्री)	260	260	240	260	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 सेमी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	39.0	40.0	40.0	40.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	17.0	18.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	6	8	9	11
पवन दिशा (डिग्री)	230	230	260	260	230
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआइ के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	37.0	38.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	20.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	4	7	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	250	250	270	250	230
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	37.0	38.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	6	6	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	280	290	260	280	250
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआइ के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	5	25	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	290	290	300	280	250
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	5	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं एवं बिजली और तेज़ हवा के साथ आंधी एक-दो स्थानों पर बूँदा बांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 06-08 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

04 अप्रैल को जिले में बिजली और तेज़ हवा के साथ आंधी एक-दो स्थानों पर बूँदा बांदी भी हो सकती है।

मौसम चेतावनीयों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गरज, आकाशीय बिजली, बूँदाबांदी और आंधी की संभावना के कारण गेहूँ और सरसों की परिपक्व फसलों को नुकसान हो सकता है। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

बूँदा बांदी की सम्भावना को देखते हुए गेहूँ एवं सरसों की तैयार फसलों की कटाई करते समय सावधानी बरतें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फ़ुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजीम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआइ करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तेज हवा, आकाशीय बिजली और आंधी से गेहूं, सरसों और बागवानी फसलों को नुकसान हो सकता है। किसान परिपक्व फसलों की जल्द कटाई करें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें, आंधी के दौरान खेतों में काम न करें और कटे हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गरज, आकाशीय बिजली, बूदाबांदी और आंधी की संभावना के कारण गेहूं और सरसों की परिपक्व फसलों को नुकसान हो सकता है। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	20.0	21.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	6	7	9	9
पवन दिशा (डिग्री)	240	230	230	230	230
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	2	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन्न करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 सेमी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	6	7	7	9
पवन दिशा (डिग्री)	250	260	240	250	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआइ के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	4	25	9	8
पवन दिशा (डिग्री)	260	260	260	250	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	5	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं एवं बिजली और तेज़ हवा के साथ आंधी एक-दो स्थानों पर बूदा बांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 06-08 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

04 अप्रैल को जिले में बिजली और तेज़ हवा के साथ आंधी एक-दो स्थानों पर बूदा बांदी भी हो सकती है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गरज, आकाशीय बिजली, बूदाबांदी और आंधी की संभावना के कारण गेहूँ और सरसों की परिपक्व फसलों को नुकसान हो सकता है। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

बूदा बांदी की सम्भावना को देखते हुए गेहूँ एवं सरसों की तैयार फसलों की कटाई करते समय सावधानी बरतें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फ़ुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजीम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआइ करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तेज हवा, आकाशीय बिजली और आंधी से गेहूं, सरसों और बागवानी फसलों को नुकसान हो सकता है। किसान परिपक्व फसलों की जल्द कटाई करें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें, आंधी के दौरान खेतों में काम न करें और कटे हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गरज, आकाशीय बिजली, बूदाबांदी और आंधी की संभावना के कारण गेहूं और सरसों की परिपक्व फसलों को नुकसान हो सकता है। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	39.0	40.0	40.0	40.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	20.0	20.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	5	6	7	8
पवन दिशा (डिग्री)	250	240	260	270	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 सेमी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	5	8	10	8
पवन दिशा (डिग्री)	270	260	270	270	250
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआइ के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	21.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	6	7	8	10
पवन दिशा (डिग्री)	250	260	250	260	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	2	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 सेमी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	5	6	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	270	290	260	260	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 सेमी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	5	26	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	270	250	260	260	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	5	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं एवं बिजली और तेज़ हवा के साथ आंधी एक-दो स्थानों पर बूँदा बांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 06-08 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

04 अप्रैल को जिले में बिजली और तेज़ हवा के साथ आंधी एक-दो स्थानों पर बूँदा बांदी भी हो सकती है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गरज, आकाशीय बिजली, बूँदाबांदी और आंधी की संभावना के कारण गेहूँ और सरसों की परिपक्व फसलों को नुकसान हो सकता है। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

बूँदा बांदी की सम्भावना को देखते हुए गेहूँ एवं सरसों की तैयार फसलों की कटाई करते समय सावधानी बरतें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फ़ुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजीम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआइ करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआइ करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआइ करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तेज हवा, आकाशीय बिजली और आंधी से गेहूं, सरसों और बागवानी फसलों को नुकसान हो सकता है। किसान परिपक्व फसलों की जल्द कटाई करें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें, आंधी के दौरान खेतों में काम न करें और कटे हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गरज, आकाशीय बिजली, बूदाबांदी और आंधी की संभावना के कारण गेहूं और सरसों की परिपक्व फसलों को नुकसान हो सकता है। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-04-2025

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-02	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	39.0	40.0	40.0	40.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	18	18	18	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	5	7	8	9
पवन दिशा (डिग्री)	240	260	260	270	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 01-06 अप्रैल के मध्य जिले में आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18-21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 18-20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 05-07 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमानित अवधि में मौसम की शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूँ की कटनी के कार्य को उच्च प्रार्थमिकता देकर संपन करे तथा सरसों, मसूर, चन्ना फसलों का दौनी एवं दानो को सूखाने का कार्य करके भंडारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले संपन्न करें। बुआई के पूर्व 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूँग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, एस0एम0एल0-668, एच0यू0एम0-16 एवं सोना तथा उरद के लिए पंत उरद-19, पंत उरद-31, नवीन एवं उत्तरा किस्में ब आई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के दो दिन पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बीजदर छोटे दानों के प्रभेदों हेतु 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के प्रभेदों हेतु 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की दूरी 30X10 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	गरमा सब्जी की बुआई प्राथमिकता से संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गा पुर मधु, सुगरबेली, अर्का ज्योती (संकर) तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा शर्बती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करैला की अर्का हरित, काशी उर्वषी, पूसा विशेष, कायमबटूर लॉग की बुआई करें। खेत की जुताई में 20-25 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
आम	आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गयी है, इस अवस्था में किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न है। मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के बाद इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0)/1 मि0ली0 दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 ग्राम/दो लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा एवं चूर्णिल आसिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा/1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी. मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>