



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	37.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	25	25	25	8	6
पवन दिशा (डिग्री)	120	100	80	80	70
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

औरंगाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	20	20	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	25	25	25	4	5
पवन दिशा (डिग्री)	130	170	100	130	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	28	28	28	28	28
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	25	25	25	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	120	100	110	110	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	37.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	25	25	4	3
पवन दिशा (डिग्री)	140	120	90	120	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	25	25	8	4
पवन दिशा (डिग्री)	110	110	80	90	70
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी0ली0 प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि0ली0 प्रति ली0 पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई0सी0 का 10 मि0ली0 या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	25	25	11	5
पवन दिशा (डिग्री)	100	100	80	80	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी0ली0 प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि0ली0 प्रति ली0 पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई0सी0 का 10 मि0ली0 या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	25	25	14	8
पवन दिशा (डिग्री)	100	90	80	80	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी0ली0 प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि0ली0 प्रति ली0 पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई0सी0 का 10 मि0ली0 या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	25	25	25	10	6
पवन दिशा (डिग्री)	110	110	90	80	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी0ली0 प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि0ली0 प्रति ली0 पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई0सी0 का 10 मि0ली0 या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	25	25	25	25
पवन दिशा (डिग्री)	120	160	110	140	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	5	4	5	4
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	25	25	25	25
पवन दिशा (डिग्री)	100	100	90	90	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	5	4	5	4
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी0ली0 प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि0ली0 प्रति ली0 पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई0सी0 का 10 मि0ली0 या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	25	25	25	11	5
पवन दिशा (डिग्री)	110	100	90	80	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	25	25	25	25
पवन दिशा (डिग्री)	100	110	100	100	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	5	4	5	4
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पाँवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	28	28	28	28	28
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	25	25	25	5	3
पवन दिशा (डिग्री)	120	100	90	120	180
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी0ली0 प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि0ली0 प्रति ली0 पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई0सी0 का 10 मि0ली0 या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	25	25	10	9
पवन दिशा (डिग्री)	110	110	70	90	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पॉवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-05-2025

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-03	2025-05-04	2025-05-05	2025-05-06	2025-05-07
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	25	25	12	8
पवन दिशा (डिग्री)	100	100	90	80	80
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	5	1	1
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 03-04 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा, मेघगर्जन एवं तेज हवा चलने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 08-14 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मी०ली० प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिण्डी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर ईथियाँन/1.5 से 2 मि०ली० प्रति ली० पानी की दर से छिड़काव करें। गरमा सब्जियों जैसे भिण्डी, नेनुआ, करैला, लौकी (कद्दू), और खीरा की फसल में निकार्ड-गुड़ाई करें।
आम	आम के बागों में फल मक्खी के प्रबन्धन के लिए "फ्रूट फ्लाई ट्रेप" स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15-20 फरोमैन ट्रेप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इन ट्रेपो को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फिट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रेप से दूसरे ट्रेप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखे। ट्रेप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखे। ट्रेप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रेप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए की कहा बाधा गया है। ट्रेप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए।
लीची	लीची के पेड़ में फल बेधक कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 ई०सी० का 10 मि०ली० या कार्बारिल 50 प्रतिशत घुलनशील पाँवडर का 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से दो छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	ब्याँने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम/लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन एवं भैस का 500 ग्राम दाना / किलो दुध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**