



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	15	15	15	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रेड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

औरंगाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	15	15	15	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन : 2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	70.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	5	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्फान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रेड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	10.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	5	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	12.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	15	15	15	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रेड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	12.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	15	15	15	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	36.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटाश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

जमुई(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	10.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	5	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	65.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	38.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	15	15	15	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	10.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	5	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटाश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

नवादा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटाश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रेंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	36.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटाश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	36.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	15	15	15	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रेड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूराँन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	15	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	90	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	6	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 29 जुलाई-02 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए एवं पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए, धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटैश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगन्धित धान के किस्मों भागलपुर कतरनी आदि की बुआई करें। किसान अपनी निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ (बाँध) बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी करें। मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन का उपरिवेशन करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	जुलाई- अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। कलमी पौधों की रोपाई 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों की 12×12 मीटर दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5×5 मीटर तथा अम्रपाली के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटैश तथा 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें।
केला	वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों (अल्पान, कँथली, मालभोग, चिनिया, जी-9) तथा बौनी किस्मों (ग्रेंड नेन, रोबस्टा, बसराई) का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0×2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश तथा 10 ग्राम कार्बोफेनथीयोन मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/लीटर पानी से उपचारित करें। टिशू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>