



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	8.0	14.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	35.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	10	5	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

औरंगाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	8.0	14.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	10	5	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	6.0	14.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	5	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	6.0	14.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	5	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	8.0	14.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	10	5	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	8.0	14.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	29.0	29.0	29.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	10	5	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने, भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	34.0	34.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

जमुई(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	6.0	14.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	5	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	8.0	65.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	29.0	29.0	30.0	30.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	10	5	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने, भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	6.0	14.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	5	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

नवादा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने, भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन : 2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	35.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्में: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्में: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	6.0	8.0	65.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	10	5	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने, भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वर्षाजल संचय हेतु तालाब, चेकडैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	6.0	8.0	16.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	180	130	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	5	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। मक्का (डीकेसी 9081, डीएचएम-117) व रागी (वीएलएम 379, आरएयू 8, बांकुला) की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की सुगन्धित किस्मों की रोपाई इस माह में पूरी कर लें। धान रोपित खेतों में 10 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। खेत में जल जमाव बनाये रखें। जुलाई माह में रोपे गये धान में नत्रजन (यूरिया) का उपरिवेशन करें। धान की रोपाई के 45-50 दिनों बाद यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें।
मक्का	खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नत्रजन की शेष मात्रा खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे दें। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में आवश्यकतानुसार गैप फिलिंगए छँटाई तथा निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मुक्त परागित किस्मों: अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी-1 एवं पंजाब लाल। संकर किस्मों: अर्का श्वेता, कोंकण कीर्ति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती एवं काशी तेज। बीज दर: मुक्त परागित किस्मों के लिए 800-1000 ग्राम/हेक्टेयर, संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम/हेक्टेयर। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। रोपाई 50×45 सेमी की दूरी पर करें तथा 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फॉस्फोरस एवं 40-50 किग्रा पोटैश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में PPR, FMD (खुरपका-मुंहपका) एवं HS (गलघोंटू) रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>