

एकमूर्ती प्रकाशन संख्या- BAU/KVK/2026-27-03



पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग एवं उपचार

प्रकाशक सह संपादक

डॉ. अनिता कुमारी

षरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान

लेखक

डॉ० मो० ज्याडल होदा

डॉ० अंजली कुमारी सिन्हा

डॉ० शशुपता परवीन

कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर, भागलपुर

बिहार कृषि विश्वविद्यालय,

सबौर - 813210

ईमेल - bhagalpurkvc@gmail.com

नवीनतम कृषि फिल्मों को देखने के लिए
हमारा यूट्यूब चैनल बनें सम्बन्धित करें।

[/bausabour](https://www.youtube.com/channel/UCbausabour)

विज्ञान हेल्प लाइन 1800 3456 455 (टोल फ्री)

बी.ए.यू. एमो डॉक्टर 700452883

आपका अपना रेडियो स्टेशन

90.8FM
green

अब मोबाइल पर उपलब्ध

Google Play

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

पशु रोग और उपचार तालिका

रोग	रोग का कारण	प्रमुख लक्षण	प्राथमिक उपचार एवं रोकथाम
खुरपका-मुंहपका (FMD)	विषाणु	मुंह और खुरों (पैरों) में छाले व घाव होना, लार टपकना, बुखार.	पैरों और मुंह को KMnO ₄ /Boric powder या फिटकरी के पानी से धोएं। FMD का टीका साल में 2 बार समय पर लगवाएं. डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाएं
गलघोंटू	जीवाणु	गले में भारी सूजन, सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ (पुस-पुस की आवाज), तेज बुखार.	नया वस्तु से पहले HS का टीका अनिवार्य लगवाएं. लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाएं
लंगड़ा बुखार / ब्लैक बार्दर	जीवाणु	पिछले पुंड (पैर) में गर्म सूजन, दबाने पर सर-चराहट की आवाज आना, लंगड़ापन.	सूजन वाले स्थान पर चीख लगाकर झाक करें, डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाएं और समय पर टीका दें.
धनैला रोग	जीवाणु (Bacteria)	धनों में सूजन, अबन का कड़ा होना, दूध में खून, मवाद या पानी जैसा पतलापन आना.	प्रभावित घन को पूरा छासी करें। एंटीबायोटिक इंटरामैमरी द्रव्य चढ़ाएं। देसी इलाज में हल्दी, एलोवेरा और चूने का लेप प्रभावी.
मिल्क फीवर (दुग्ध उत्पर)	कैल्शियम की कमी	ब्याने (बट्ठा देने) के तुरंत बाद पशु का ठंडा पड़ जाना, बैठ जाना और गर्दन मोड़कर पेट पर रखना.	डॉक्टर की सलाह से नस (vein) द्वारा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट (Calcium Borogluconate) का इंजेक्शन दें.
अफरा (Bloat / Tympany)	खान-पान (द्रुषित या अधिक हरा घास)	पेट का बाईं ओर से अत्यधिक फूल जाना, पशु का बेचैन होना, सांस लेने में दिक्कत.	पशु को तारपीन का तेल (मीठे तेल या अलसी के तेल के साथ) पिलाएं, या पेट से गैस निकालने के लिए टोकार वैजुता का उपयोग करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाएं
परजीवी रोग	कीड़े, जूं, किलनी	पशु का कमजोर होना, घमड़ी खुरदरी होना, दस्त और दूध उत्पादन में कमी.	डॉक्टर की सलाह से नियमित अंतराल पर कृमिनाशक दवा (Deworming) (जैसे एन्थैल्माजोन, आइवर्मेक्टिन) दें. बाइच परजीवी की Amitraz (अमिब्राज - 12.5%): यह सबसे प्रभावी लिक्विड है। इसकी 2 मिली मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर पशु के शरीर पर (आंख, मुंह और धन बचाकर) लगाया जाता है। लगाने के बाद पशु को 2-3 घंटे तक चाटने न दें।

माय और ब्रैस के प्रजनन रोगों का उपचार (Reproductive Diseases & Treatment)			
बीमारी का नाम (Disease Name)	मुख्य लक्षण (Symptoms)	मुख्य कारण (Main Causes)	उपचार और प्रबंधन (Treatment & Management)
एनेस्ट्रस (Anestrus) - पशु का ताप/गर्मी में न आना	(i) पीपक तनों और गिजरल ग्लैंड्स की कमी। (ii) पेट में कीड़े होना। (iii) हार्मोनल असंतुलन।	(i) ब्याने के बंद समय बाद ओ पशु का गर्मी के लक्षण न दिखाना। (ii) अंडाशय (Ovaries) का निष्क्रिय होना।	(i) कृत्रिमतापक: सबसे पहले पेट के कीड़े की दवा (Deworming) दें। (ii) मिनेरल मिक्चर: रोजाना 50-100 ग्राम अच्छी गुणवत्ता का मिनेरल मिक्चर दें। (iii) हार्मोन थेरेपी: डॉक्टर की सलाह से GnRH या प्रोमोस्टेरान (ज़ेन प्रोने) हार्मोन का बोर्स कराएँ। (iv) देखीं: उपवास: जाचफान या अंकुरित गेहूँ खिलाया मददगार होता है।
रिपीट ब्रीडिंग (Repeat Breeding) - बार-बार फिरना	(i) गर्भाशय में संक्रमण (Metritis)। (ii) गलत समय पर ए.आई. करना। (iii) जड़े का समय पर न निकलना (Delayed Ovulation)।	पशु का बार-बार ताप में आना लेकिन ए.आई. (A.I.) या सांड से मिलाने पर भी गर्भाशय न ठहरना।	(i) एंटीबायोटिक इंफ़्यूज़न: डॉक्टर से नार्मोसय (बच्चादात्री) की सफाई करवाकर 3-5 दिन तक दवा बनेवाए। (ii) हार्मोन इंजेक्शन: ए.आई. (A.I.) करने के तुरंत बाद या ठीक पहले Receptal (GnRH) या LH का इंजेक्शन लगावाए। सही समय पर नार्मोसय: सुबह ताप में आने वाले पशु को शाम को और शाम को आने वाले को अगली सुबह ए.आई. करें।
जेर का रुकना (Retention of Placenta - ROP)	(i) कैल्शियम या विटामिन E और सेलेनियम की कमी। (ii) कठिन प्रसव (Dystocia) या समय से पहले बच्चा देना।	ब्याने के 8 से 12 घंटे बाद प्लेसेंटा (Placenta) का अपने आप बाहर न निकलना।	(i) हाथ से न खिंचवाएँ: जेर को जबरदस्ती हाथ से खींचकर कभी न निकलवाएँ, इससे संक्रमण फैल सकता है। (ii) लिक्विड दवाएँ: ब्याने के तुरंत बाद Exaper, Uterotone या Involon जैसी प्रोमोसय साफ करने वाली दवा पिलाएँ। - इंजेक्शन: डॉक्टर से एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और कैल्शियम (जैसे Milox) का इंजेक्शन लगावाएँ।
गर्भाशय का बाहर आना (Protrusion of Uterus) - पीछा दिखावा/फूल आना	(i) धीरे-धीरे कैल्शियम की कमी। (ii) पशु का अत्यधिक ज़ोर लगाना या सीतनादस्तान वाली जगह पर बैठना।	ब्याने के ठीक पहले या बाद में गर्भाशय (बच्चादात्री) या योनि का दिस्साधारित से बाहर लटक जाना।	(i) सफाई: बाहर निकले भाग को तुरंत ठंडे पानी और लाल दवा (Potassium Permanganate) के घोल से धोकर साफ करें। (ii) बापस डालना: पशु चिकित्सक से इसे सुरक्षित तरीके से अंदर करवाकर रस्सी का छिका (Truss) बांधवाएँ या टांके लगावाएँ। (iii) इंजेक्शन: कैल्शियम बोरोग्लूकोन की बोतल छड़वाएँ और यदि व नुस्खे काम करने के इंजेक्शन दें।

बकरी के प्रमुख रोग और उपचार तालिका (Goat Diseases and Treatment Table)

रोग	रोग का कारण	मुख्य लक्षण	बायोलॉजिक उपचार एवं रोकथाम
पी.पी.आर. गोट प्लेग	विषाणु	तेज बुखार, मुँह में छाले नाक-आँख से पानी बहना, बदबूदार दस्त, साँस में तकलीफ.	इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। डॉक्टर से एंटीबायोटिक और लिबर टॉनिक दितवाएं। बचाव के 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं.
ई.टी. फिडिकिया	जीवाणु	पेट में तेज दर्द, बकरी का अचानक चक्कर खाकर गिरना, पीछे की तरफ गर्दन मोड़ना और मील.	बौगारी आने पर इलाज का समय नहीं मिलता। इसे घास चराने से पहले बचाव के 1 साल में एक बार ET का टीका (वर्षा ऋतु से पहले) अवश्य लगवाएं.
चेचक	विषाणु	शरीर पर, विशेषकर धन, मुँह और पूँछ के पास दाने या चेचक के छाले होना, तेज बुखार.	टॉनी पर पोटेशियम परमैंगनेट (KMnO4) या नीम का पानी लगाएं। हर साल मोट पेंस का टीका लगवाएं.
छुरपका-मुँहपका	विषाणु	मुँह और खुरी के बीच छाले व घाव होना, संगड़ाकर चलना, लार टपकना.	पैरो और मुँह को लाल दवा KMnO4 या फिटकरी के पानी से धोएं। FMD का टीका साल में 2 बार समय पर लगवाएं.
निमोनिया	ठंड या बैक्टीरिया	खासी, साँस तेजे, लमघ पाली चलना, नाक से गाढ़ा बलगम आना, सुस्ती.	बकरी को ठंड और खीनन से बचाएं। डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं.
परजीवी / पेट के कीड़े	आंतरिक परजीवी	बकरी का वजन न बढ़ना, पेट लटक जाना, जबड़े के नीचे सूजन (Bottle Jaw), दस्त.	हर 3 से 4 महीने में कृमिनाशक दवा (Deworming) जैसे Fenbendazole या Albendazole बदल-बदल कर दें.
दगड़ी / पतैला	जीवाणु	अधन (धन) का सूज जाना, गर्म होना, दूध में शक्के या खून आना.	धन को पुरा खाली करें। डॉक्टर से एंटीबायोटिक द्रव्य धन में चड़वाएं और धनों की साफ-सफाई रखें.

बकरी पालकों के लिए जरूरी बातें:

टीकाकरण (Vaccination): बकरीयों को बीमारियों से बचाने का सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका समय पर टीकाकरण है।

क्वार्टाइन: बाजार से लाई गई नई बकरी को कम से कम 14 दिनों तक अपने फार्म की पुरानी बकरीयों से अलग रखें।

